




















Coca-Cola


14


13






18


19


20


Coca-Cola
21




23












JO-900-NS




Lilo Mall




Lilo Mall




აქ ყველა ფერია


37
















BA-132-AB




VV-
304-SS




SB-336-SS
















































































91












99








103






107






HP-271-PH








114
GE
LE-777-RI




CC-728-NN


044-DO
NI-300-KA


118


119

120


UL-
123-UU




QQ-823-CQ


KO-008


































GX-200-SI


GX 460
-200-SI












171




1733








177












RS-
852-SR






187








192






200

















211








BORJOMI


























WC


241


243









249


25 1










256


257



259


250


HH-589-ZZ


6610
6610
Hamlet









































295

296


292

298

299


300

301


BRISTAR




Front
GE LUX
Slim Built-In Dishwasher
Water-Dispenser
Design for Excellence
ENERGY CLAS
76 LİTER
XXL CAVITY


Nextst
Nex


Nex






STRONG
STRONG
STRONG


STRONG
STRONG
A Colourful world




STRONG
STRONG
A Colourful world


Next&NextStar
OPEN


EXCHANGE
LOUNG BAR
BEER
COFFE
Next8




RES URANT
SHAR
COFFE
LE BEAU
SALON


NextStar
Next CA


Nextstar


TERMI
327
TCL
AIR CONDITIONER


TERMİKEL
TERMİKEL


TERMİKEL
TERMİKEL
TERMİKEL
TCL
UHD TV


TERMIKEL
TERMIKEL




336








340
341




344


354





























360










366
















375





389

381




383

ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა:
a.aptsiauri13@gmail.com მობ. 551 156 154

№29 2 თებერვალი 2024 წ.

მწვანე ნარგავების გადარგვის
ტექნოლოგია

ქ.თბილისი დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; (ს/კ 01.19.13.002.566), N27 კვიპაროზი (D=32,2სმ)

პირველ ეტაპზე ჯერ უნდა ამოთხრილი იქნას ორმო, რომელშიც უნდა ჩაირგას გადასარგავი ხე-მცენარე, ორმოს სიმაღლე და სიგანე უნდა იყოს იმ ზომის, რომ ხე-მცენარე ძალიან თავისუფლად ეტეოდეს ორმოში. ასაშენებელი შენობის საძირკველის გათხრის პროცესში ექსკავატორის საშუალებით მოითხრება მიწა გადასარგავი ხე-მცენარეების გარშემო იმ პირობით, რომ მისი ფესვთა სისტემა და განსაკუთრებით მთავარი ფესვი არ დაზიანდეს. ეს კი მიღწევადია, თუ ხის გარშემო მიწა მოითხრება ხის ფესვის ყელიდან 40 – 50 სმ–ის რადიუსით (დამოკიდებულია ხის დიამეტრის სიმსხოზე) წრიულად გარშემო. ექსაკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით აწეული უნდა იქნას მაღლა, რომ ძირითადი ფესვი (და დამატებითი ფესვებიც) წაეჭრას. ასევე მოხდეს ამ ფესვებისა და მიწის, რომელიც ფესვებს გაყვება შეკვრა ჯვალოს ტომრით. ამ ხის გადარგვამდე, ხე თავისუფლდება ქვედა იმ ტოტებისაგან, რომლებიც უსწორმასწოროდ არიან განლაგებული. ვინაიდან ხე გადასარგავია იქვე ტერიტორიაზე (დაახლოებით 5 – 8 მეტრის მანძილზე), ხეს ძირიდან ასწევენ ექსკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით, ხოლო იმისათვის, რომ ხემ წონასწორობა შეინარჩუნოს (ეს აუცილებელი პირობაა) გადატანის დროს, საჭიროა ხის ვარჯი აწეულ იქნას მკვრივი ნაჭრისგან შეკერილი (ხის მერქანი, რომ არ დაზიანდეს) ბრტყელი ასაწევი თოკისგან რომელიც მჭიდროდ შემოეკვრება ხის ტანს და მეორე ბოლოთი ჩამოეკიდება

ექსკავატორის კბილს) და დაახლოებით ვერტიკალურ მდგომარეობაში აიწიოს და გადატანილ იქნას სპეციალურად მომზადებულ ორმოში, სადაც ხის ჩარგვამდე უნდა ჩაიყაროს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ.

ჩაისხას 10 ლიტრი წყალი (მიწა რომ გაიჟიჟოს) და მიწიანად ჩაისვას ორმოში ვერტიკალურ მდგომარეობაში. მიწის ჩაყრის დროს პერიოდულად მიწა უნდა დაიტკეპნოს (მუდმივად ამ პროცესის მიმდინარეობისას ყურადღება მიექცეს იმ გარემოებას, რომ ხემ ვერტიკალური მდგომარეობა შეინარჩუნოს). გადარგვის შემდეგ ხე უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვის შემდეგ აუცილებელია შეირჩეს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ივალდებულებს, რომ ხე–მცენარეს რეგულარულად მორწყავს. პირველი ერთი კვირის მანძილზე დღეში ერთხელ – ან დილას, ან საღამოს 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით სპეციალურად მოწყობილ ჯამში (მიწის შემაღლებული ფენა, რომელიც ხე–მცენარის ფესვის ყელის გარშემო იქნება შემოვლებული – წვიმიან ამინდშიც კი). მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე კიდევ 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით დილაობით. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 100 ლიტრი ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფციაური

პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი

ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა:
a.aptsiauri13@gmail.com მობ. 551 156 154

№28 2 თებერვალი 2024 წ.

მწვანე ნარგავების გადარგვის
ტექნოლოგია

ქ.თბილისი დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; (ს/კ 01.19.13.002.566), N26 კვიპაროზი (D=41,5სმ)

პირველ ეტაპზე ჯერ უნდა ამოთხრილი იქნას ორმო, რომელშიც უნდა ჩაირგას გადასარგავი ხე-მცენარე, ორმოს სიმაღლე და სიგანე უნდა იყოს იმ ზომის, რომ ხე-მცენარე ძალიან თავისუფლად ეტეოდეს ორმოში. ასაშენებელი შენობის საძირკველის გათხრის პროცესში ექსკავატორის საშუალებით მოითხრება მიწა გადასარგავი ხე-მცენარეების გარშემო იმ პირობით, რომ მისი ფესვთა სისტემა და განსაკუთრებით მთავარი ფესვი არ დაზიანდეს. ეს კი მიღწევადია, თუ ხის გარშემო მიწა მოითხრება ხის ფესვის ყელიდან 40 – 50 სმ–ის რადიუსით (დამოკიდებულია ხის დიამეტრის სიმსხოზე) წრიულად გარშემო. ექსაკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით აწეული უნდა იქნას მაღლა, რომ ძირითადი ფესვი (და დამატებითი ფესვებიც) წაეჭრას. ასევე მოხდეს ამ ფესვებისა და მიწის, რომელიც ფესვებს გაყვება შეკვრა ჯვალოს ტომრით. ამ ხის გადარგვამდე, ხე თავისუფლდება ქვედა იმ ტოტებისაგან, რომლებიც უსწორმასწოროდ არიან განლაგებული. ვინაიდან ხე გადასარგავია იქვე ტერიტორიაზე (დაახლოებით 5 – 8 მეტრის მანძილზე), ხეს ძირიდან ასწევენ ექსკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით, ხოლო იმისათვის, რომ ხემ წონასწორობა შეინარჩუნოს (ეს აუცილებელი პირობაა) გადატანის დროს, საჭიროა ხის ვარჯი აწეულ იქნას მკვრივი ნაჭრისგან შეკერილი (ხის მერქანი, რომ არ დაზიანდეს) ბრტყელი ასაწევი თოკისგან რომელიც მჭიდროდ შემოეკვრება ხის ტანს და მეორე ბოლოთი ჩამოეკიდება

ექსკავატორის კბილს) და დაახლოებით ვერტიკალურ მდგომარეობაში აიწიოს და გადატანილ იქნას სპეციალურად მომზადებულ ორმოში, სადაც ხის ჩარგვამდე უნდა ჩაიყაროს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ.

ჩაისხას 10 ლიტრი წყალი (მიწა რომ გაიჟიჟოს) და მიწიანად ჩაისვას ორმოში ვერტიკალურ მდგომარეობაში. მიწის ჩაყრის დროს პერიოდულად მიწა უნდა დაიტკეპნოს (მუდმივად ამ პროცესის მიმდინარეობისას ყურადღება მიექცეს იმ გარემოებას, რომ ხემ ვერტიკალური მდგომარეობა შეინარჩუნოს). გადარგვის შემდეგ ხე უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვის შემდეგ აუცილებელია შეირჩეს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ივალდებულებს, რომ ხე–მცენარეს რეგულარულად მორწყავს. პირველი ერთი კვირის მანძილზე დღეში ერთხელ – ან დილას, ან საღამოს 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით სპეციალურად მოწყობილ ჯამში (მიწის შემაღლებული ფენა, რომელიც ხე–მცენარის ფესვის ყელის გარშემო იქნება შემოვლებული – წვიმიან ამინდშიც კი). მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე კიდევ 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით დილაობით. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 100 ლიტრი ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფციაური

პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი



ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა: a.aptsiauri13@gmail.com
ტ. 551 156 154

№157 7 ივლისი 2022 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და
ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 4 ივლისს ქალაქი თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; მისამართზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.13.002.049) არსებულ ტერიტორიაზე მესაკუთრე შპს „ლილო მოლი“-ს (ს/კ 208150506) მომართვის საფუძველზე მეტყევე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავის ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს ხე- მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და “პი“-ზე ანუ 3,14-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 383 ძირი ნარგავი, რომელთაგან 162 ძირი წიწვოვანია, დანარჩენები ფოთლოვანი, რომელთაგან 46 ძირი ხილ-კენკროვანია.

დამკვეთი ხილ-კენკროვნებს გამოიყენებს შეხედულებისამებრ.

პირველ ეტაპზე ჯერ უნდა ამოთხრილი იქნას ორმო, რომელშიც უნდა ჩაირგას გადასარგავი ხე-მცენარე, ორმოს სიმაღლე და სიგანე უნდა იყოს იმ ზომის, რომ ხე-მცენარე ძალიან თავისუფლად ეტეოდეს ორმოში. ასაშენებელი შენობის საძირკველის გათხრის პროცესში ექსკავატორის საშუალებით მოითხრება მიწა გადასარგავი ხე-მცენარეების გარშემო იმ პირობით, რომ მათი ფესვთა სისტემა და განსაკუთრებით მთავარი ფესვი არ დაზიანდეს. ეს კი მიღწევადია, თუ ხის გარშემო მიწა მოითხრება ხის ფესვის ყელიდან 40 – 50 სმ–ის რადიუსით (დამოკიდებულია ხის დიამეტრის სიმსხოზე) წრიულად გარშემო. ექსაკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით აწეული უნდა იქნას მაღლა, რომ ძირითადი ფესვი (და დამატებითი ფესვებიც) წაეჭრას. ასევე მოხდეს ამ ფესვებისა და მიწის, რომელიც ფესვებს გაყვება შეკვრა ჯვალოს ტომრით. ფოთლოვანი ხის გადარგვამდე, ხე თავისუფლდება

ტოტებისაგან 3,6 მეტრის სიმაღლემდე. ვინაიდან ხე გადასარგავია იქვე ტერიტორიაზე (დაახლოებით 5 – 8 მეტრის მანძილზე), ხეს ძირიდან ასწევენ ექსკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით, ხოლო იმისათვის, რომ ხემ წონასწორობა შეინარჩუნოს (ეს აუცილებელი პირობაა) გადატანის დროს, საჭიროა ხის ვარჯის ძირში შემოეკრას რეზინის ფურცლები (ხის მერქანი, რომ არ დაზიანდეს) და ამწეს (გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ხის წონა მიწიანად შესაძლებელია იყოს 1,0 – 2,5 ტონა, ამიტომ ამწეს ტვირთამწეობა უნდა იყოს არა ნაკლები 5 ტონა) ჯალამბარის გამოყენებით დაახლოებით ვერტიკალურ მდგომარეობაში აიწიოს და გადატანილ იქნას სპეციალურად მომზადებულ ორმოში, სადაც ხის ჩარგვამდე უნდა ჩაიყაროს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ.

ჩაისხას 10 ლიტრი წყალი (მიწა რომ გაიჟიჟოს) და მიწიანად ჩაისვას ორმოში ვერტიკალურ მდგომარეობაში. მიწის ჩაყრის დროს პერიოდულად მიწა უნდა დაიტკეპნოს (მუდმივად ამ პროცესის მიმდინარეობისას ყურადღება მიექცეს იმ გარემოებას, რომ ხემ ვერტიკალური მდგომარეობა შეინარჩუნოს). გადარგვის შემდეგ ხე უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვის შემდეგ აუცილებელია შეირჩეს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ივალდებულებს, რომ ხე–მცენარეს რეგულარულად მორწყავს. პირველი ერთი კვირის მანძილზე დღეში ერთხელ – ან დილას, ან საღამოს 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით სპეციალურად მოწყობილ ჯამში (მიწის შემაღლებული ფენა, რომელიც ხე–მცენარის ფესვის ყელის გარშემო იქნება შემოვლებული – წვიმიან ამინდშიც კი). მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე კიდევ 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით დილაობით. გადარგული ნარგავების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 10 ლიტრი ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ცხრილში მოცემულია ქალაქი თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; მისამართის (საკადასტრო კოდი: 01.19.13.002.049) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა, დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე და შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება:

| № რიგ ზე | მერქნიანი სახეობა | $D_{10}$ დიამეტრი 10 სმ-ზე | სამეურნეო ღონისძიება<br>წითელი - ექვემდებარება მოჭრას,<br>ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას,<br>მწვანე - ადგილზე რჩება | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ტუია(Tuia occidentalis) | 15,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 2 | ნეკერჩხალი მინდვრის(Acer campestre) | 15,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 3 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 18,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 4 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 16,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 5 | ცაცხვი(Tilia caucasica | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 6 | ნეკერჩხალი მინდვრის(Acer campestre) | 13,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 7 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 17,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 8 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 9 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 14,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 10 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 20,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 11 | ნეკერჩხალი მინდვრის(Acer campestre) | 21,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 12 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 12,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 13 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 13,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 14 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 14,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 15 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 16 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 20,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ნეკერჩხალი მინდვრის(Acer campestre) | 22,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 18 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 17,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 19 | ნეკერჩხალი მინდვრის(Acer campestre) | 15,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 20 | იფანი(Fraxinus excelsior) | 14,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 21 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 18,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 22 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 23,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 23 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 20,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 24 | ცაცხვი(Tilia caucasica) | 22,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 25 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 8,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 26 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 41,5 | ჯანსაღი | |
| 27 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 32,2 | ჯანსაღი | |
| 28 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 33,7 | ჯანსაღი | |
| 29 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 18,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 30 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,4 | მაღალი ძირკვი | |
| 31 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 18,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 32 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 10,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 33 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 34 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 36 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 37 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 38 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 39 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 10,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 40 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 41 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 42 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 43 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 44 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 45 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 17,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 46 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 14,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 47 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 20,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 48 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 27,7 | ჯანსაღი | |
| 49 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 50 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 25,9 | ჯანსაღი | |
| 51 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 18,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 53 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 22,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 54 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 22,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 55 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 23,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 56 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 21,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 57 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 21,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 58 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 25,3 | ჯანსაღი | |
| 59 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 60 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 22,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 61 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 62 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 63 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 18,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 64 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 17,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 65 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 24,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 66 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 21,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 67 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 18,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 68 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 20,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 17,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 70 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 24,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 71 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 17,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 72 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 17,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 73 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 20,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 74 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 75 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 76 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 77 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 18,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 78 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 79 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 80 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 81 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 14,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 82 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 83 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 84 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 13,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 86 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 87 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 88 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 89 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 90 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 15,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 91 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 92 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 93 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 94 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 16,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 95 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 96 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 97 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 13,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 98 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 99 | მუხა(Querqus iberica) | 7,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 100 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 7,6 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 11,7 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 102 | ვარდი(Rosa) | 7,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 103 | მუხა(Querqus iberica) | 8,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 104 | ვარდი(Rosa) | 2,4 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 105 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 8,6 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 106 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 7,6 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 107 | მუხა(Querqus iberica) | 8,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 108 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 17,6 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 109 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 13,9 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 110 | მუხა(Querqus iberica) | 7,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 111 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 112 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 8,1 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 113 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 6,2 | ჯანსაღი, 1 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 114 | ვაზი(Vitis vinifera) | 3,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 115 | მუხა(Querqus iberica) | 6,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 116 | მუხა(Querqus iberica) | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 117 | მუხა(Querqus iberica) | 3,6 | ჯანსაღი, 2კაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 118 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 119 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 8,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 120 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,4 – 4,7 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 121 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 13,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 122 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 11,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 123 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 8,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 124 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 11,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 125 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 13,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 126 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 10,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 127 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 8,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 128 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 29,2 | ჯანსაღი | |
| 129 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 33,3 | ჯანსაღი | |
| 130 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 3,9 | ზეხმელი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 131 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 9,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 132 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 9,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 133 | ფიჭვი იტალიური(Pinus pinea) | 10,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 134 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 22,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 135 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 22,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 136 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 35,2 | ჯანსაღი | |
| 137 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 13,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 138 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 139 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 140 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 25,8 | ჯანსაღი | |
| 141 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 14,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 142 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 22,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 143 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 12,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 144 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 145 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 146 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 19,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 147 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 20,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 148 | თუთა(Marus alba) | 4,2 | ჯანსაღი, | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 149 | თუთა(Marus alba) | 33,9 | ჯანსაღი | |
| 150 | ტირიფი(Salix alba) | 12,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 151 | ტირიფი(Salix alba) | 13,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 152 | ვაზი(Vitis vinifera) | 1,5 – 2,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, სამი ძირი | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 153 | თუთა(Marus alba) | 18,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 154 | თრიმლი(Cotinus Coggygria) | 7,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 155 | ნეკერჩხალი ამერიკული(El Acer negundo) | 9,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 156 | ნეკერჩხალი ამერიკული(El Acer negundo) | 12,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 157 | ნეკერჩხალი ამერიკული(El Acer negundo) | 11,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 158 | ჭერამი(Prunus Armeniaca) | 8,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 159 | ატამი(Prunus persica) | 2,2 – 5,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 2 ძირი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 160 | კაკალი(Junglans regia) | 8,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 161 | ბროწეული(Punica Granatum) | 6,5 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 162 | ქლიავი(Prunus domestica L) | 8,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 163 | ტყემალი(Prunus insititia L.) | 9,3 | ზეხმელი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 164 | ტყემალი(Prunus insititia L.) | 18,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 165 | ქლიავი(Prunus domestica L) | 14,4 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 166 | ვაზი(Vitis vinifera) | 4,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 167 | ლეღვი(Picus Carica) | 7,9 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 168 | ვაშლი(Molus sylvestris Mill.) | 7,2 | ზეხმელი, ხილ-კენკროვანი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 169 | ქლიავი(Prunus domestica L) | 8,8 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 5 ამონაყარი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 170 | ვაზი(Vitis vinifera) | 1,4 | გადანაჭერი, ხილ-კენკროვანი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 171 | ტირიფი(Salix alba) | 38,7 | ჯანსაღი | |
| 172 | ვაზი(Vitis vinifera) | 8,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 173 | თუთა(Marus alba) | 25,9 | ჯანსაღი | |
| 174 | ტირიფი(Salix alba) | 27,3 | ზეხმელი | |
| 175 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 14,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 176 | თუთა(Marus alba) | 25,3 | ჯანსაღი | |
| 177 | ბროწეული(Punica Granatum) | 1,7 – 2,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 2 ბუჩქი | |
| 178 | ტირიფი(Salix alba) | 2,1 – 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 179 | ტირიფი(Salix alba) | 26,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 180 | ტირიფი(Salix alba) | 22,3 | ზეხმელი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 181 | ბუდლეია(**Buddleia)** | 3,4 – 4,5 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 182 | ტირიფი(Salix alba) | 24,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 183 | თუთა(Marus alba) | 8,9 | ჯანსაღი, ორკაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 184 | ტირიფი(Salix alba) | 36,4 | ზეხმელი | |
| 185 | თუთა(Marus alba) | 9,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 186 | თუთა(Marus alba) | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 187 | ტყემალი(Prunus insititia L.) | 2,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 188 | ლელვი(Picus Carica) | 33,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 189 | ვაზი(Vitis vinifera) | 1,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 190 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 2,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 191 | ვაზი(Vitis vinifera) | 4,5 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 192 | ვაზი(Vitis vinifera) | 5,4 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 193 | ვაზი(Vitis vinifera) | 3,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 194 | ნეკერჩხალი (Acer campestre) | 10,8 | ჯანსაღი, წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 195 | ტირიფი(Salix alba) | 41,2 | ჯანსაღი | |
| 196 | ვერხვი(Populus tremula) | 33,8 | ჯანსაღი | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 197 | ნეკერჩხალი მინდვრის(Acer campestre) | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 198 | ვერხვი(Populus tremula) | 78,6 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 199 | თუთა(Marus alba) | 42,3–116,7 | ჯანსაღი, 4კაპი | |
| 200 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 6,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 201 | ვაზი(Vitis vinifera) | 2,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 202 | თუთა(Marus alba) | 55,7 | ჯანსაღი | |
| 203 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 23,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 204 | თუთა(Marus alba) | 31,2 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 205 | თუთა(Marus alba) | 22,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 206 | თუთა(Marus alba) | 19,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 207 | თუთა(Marus alba) | 38,6 – 61,1 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 208 | თუთა(Marus alba) | 14,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 209 | თუთა(Marus alba) | 18,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 210 | ლელვი(Picus Carica) | 13,5 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 211 | ვაზი(Vitis vinifera) | 9,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 212 | თუთა(Marus alba) | 38,9 | 3 ძირი ამონაყარი ძირკვზე | |
| 213 | ლელვი(Picus Carica) | 3,5 – 8,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, 8 ამონაყარი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 214 | თუთა(Marus alba) | 14,4 – 24,2 | ჯანსაღი, 3კაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 215 | ქლიავი(Prunus domestica L) | 19,9 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი,4კაპი,6 ამონაყარი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 216 | გლედიჩია(Gleditschia macrocantra) | 2,8 – 4,3 | ჯანსაღი, 5 ძირი, 5 ბუჩქი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 217 | აკაკი(Celtis caucasica) | 26,1 | ჯანსაღი | |
| 218 | თელა (Ulmus carpinifolia) | 58,2 | ჯანსაღი | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 219 | გლედიჩია(Gleditschia macrocantra) | 9,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 220 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 12,5 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 221 | თრიმლი(Cotinus Coggygria) | 2,3 – 2,9 | ჯანსაღი, 7 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 222 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 41,5 | ჯანსაღი | |
| 223 | ასკილი(Roza canina) | 2,5 – 3,8 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 10 ძირი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 224 | ვაზი(Vitis vinifera) | 3,9 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 225 | ლელვი(Picus Carica) | 3,9 – 11,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, 7 ძირი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 226 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 8,7 – 23,8 | ჯანსაღი, 6 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 227 | ბალი(**Prunus avium**) | 33,1 | ხილ-კენკროვანი, ხმობადი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 228 | თუთა(Marus alba) | 20,9 | ზეხმელი | |
| 229 | თუთა(Marus alba) | 29,5 | ჯანსაღი | |
| 230 | ტყემალი(Prunus insititia L.) | 31,6 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, ორკაპი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 231 | თუთა(Marus alba) | 40,4 | ჯანსაღი | |
| 232 | ტყემალი(Prunus insititia L.) | 38,1 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 233 | ტირიფი(Salix alba) | 23,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 234 | ტირიფი(Salix alba) | 13,4 – 15,6 | ჯანსაღი, ორკაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 235 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 236 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 3,8 | ჯანსაღი, ორკაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 237 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 238 | ბიოტა(Biota (occidentalis) | 3,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 239 | თუთა(Marus alba) | 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 240 | ბიოტა(Biota (occidentalis) | 4,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 241 | ტუია(Tuia occidentalis) | 5,9 | ჯანსაღი, 7 წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 242 | ბიოტა(Biota (occidentalis) | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 243 | ტუია(Tuia occidentalis) | 6,1 | ჯანსაღი, 7 წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 244 | ტუია(Tuia occidentalis) | 5,9 | ჯანსაღი, 5 წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 245 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 246 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 247 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 248 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 249 | ტუია(Tuia occidentalis) | 5,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 250 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 11,6 | ჯანსაღი, 6 ძირი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 251 | ტუია(Tuia occidentalis) | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 252 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 253 | ტუია(Tuia occidentalis) | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 254 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 255 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 9,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 256 | ტუია(Tuia occidentalis) | 14,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 257 | ტუია(Tuia occidentalis) | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 258 | ლელვი(Picus Carica) | 3,1 – 5,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 3 ამონაყარი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 259 | გლედიჩია(Gleditschia macrocantra) | 2,5 – 5,6 | ჯანსაღი, 2 ბუჩქი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 260 | გლედიჩია(Gleditschia macrocantra) | 3,1 – 7,8 | ზეხმელი | |
| 261 | ლელვი(Picus Carica) | 9,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, წვრილი ამონაყარი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 262 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 5,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 263 | თრიმლი(Cotinus Coggygria) | 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 264 | ნეკერჩხალი(Acer campestre) | 4,5 | ჯანსაღი, 3 ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 265 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 266 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 4,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 267 | თრიმლი(Cotinus Coggygria) | 3,6 | ზეხმელი | |
| 268 | აკაკი(Celtis caucasica) | 4,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 269 | თრიმლი(Cotinus Coggygria) | 4,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 270 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 271 | ზღმარტლი იაპონური(Mespilus japonica) | 1,8 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 272 | ზღმარტლი იაპონური(Mespilus japonica) | 2,9 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 273 | ქლიავი(Prunus domestica L) | 2,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 274 | აკაკი(Celtis caucasica) | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 275 | აკაკი(Celtis caucasica) | 4,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 276 | აკაკი(Celtis caucasica) | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 277 | აკაკი(Celtis caucasica) | 3,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 278 | კვიდო(Ligustrum vulgare l). | 2,6 – 2,9 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 279 | კვიდო(Ligustrum vulgare l). | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 280 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 5,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 281 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 4,6 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 282 | კვიდო(Ligustrum vulgare l). | 2,8 – 3,2 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 283 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 2,4 – 3,1 | ჯანსაღი ხილ-კენკროვანი, 3 ძირი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 284 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 7,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 285 | აკაკი(Celtis caucasica) | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 286 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 5,4 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 287 | ოლეანდრი(Nerium oleander l.) | 3,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 288 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 4,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 289 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 6,9 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 290 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 7,2 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 291 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 6,7 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 292 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 293 | თელა(Ulmus carpinifolia) | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 294 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 6,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 295 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 2,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 296 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 3,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 297 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 298 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 2,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 299 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 2,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 300 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 2,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 301 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 3,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 302 | ტუია ოქროსფერი(Tuia occidentalis) | 7,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 303 | ტუია ჩვეულებრივი(Tuia occidentalis) | 3,6 – 3,8 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 304 | ტუია ჩვეულებრივი(Tuia occidentalis) | 2,7 – 3,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 305 | ტუია ჩვეულებრივი(Tuia occidentalis) | 5,1 | ჯანსაღი, 1 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 306 | ვარდი(Rosa) | 1,6 -1,9 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 307 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 1,9 – 2,9 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 308 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 22,3 | ჯანსაღი, 9 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 309 | ტუია(Tuia occidentalis) | 7,5 | ჯანსაღი 1 ძირი, 2 ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 310 | ნეკერჩხალი ამერიკული(El Acer negundo) | 16,3 | ჯანსაღი, 2 ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 311 | გლედიჩია(Gleditschia macrocantra) | 6,5 – 8,5 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 312 | გლედიჩია(Gleditschia macrocantra) | 3,8 – 7,3 | ჯანსაღი, 7 ძირი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 313 | ნეკერჩხალი ამერიკული(El Acer negundo) | 9,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 314 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 315 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 316 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 317 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 318 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 319 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 320 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 321 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 7,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 322 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 323 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 324 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 7,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 325 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 326 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 327 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 7,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 328 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 329 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 6,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 330 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 7,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 331 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 332 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 333 | კვიპაროზი(Cupressus Sempervirens L) | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 334 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 1,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 335 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 1,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 336 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 1,3 – 2,9 | ჯანსაღი ხილ-კენკროვანი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 337 | ოლეანდრი(Nerium oleander l.) | 1,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 338 | იასამანი(Syringa vulgaris l.) | 2,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 339 | ალუბალი(Prunus Cerasus L) | 2,5 | ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 340 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 341 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 342 | იასამანი(Syringa vulgaris l.) | 2,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 343 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 344 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,2 – 6,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 345 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 346 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,5 – 6,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 347 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 348 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 349 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 350 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,1 – 5,8 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 351 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 3,4 – 4,1 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 352 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 5,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 353 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2,2 – 3,2 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 354 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 355 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 1,9 – 3,2 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 356 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 357 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2,4 – 3,1 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 358 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,1 – 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 359 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2.3 – 2,9 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 360 | იაპონური ზღმარტლი(Mespilus japonica) | 3,1 | ჯანსაღი ხილ-კენკროვანი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 361 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2.2 – 3.4 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 362 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 2,9 – 3,8 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 363 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2.1 – 3.2 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 364 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 2,9 – 4,2 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 365 | ვარდი(Rosa) | 2.3 – 3,5 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 366 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 2,8 – 3,6 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 367 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2,4 – 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 368 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,3 – 4,1 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 369 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2.2 – 3.7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 370 | აუკუბა(Aucuba japonica) | 3,1 – 4,3 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 371 | ჭანჭყატი(Euonymus verrucose) | 2,1 – 3,5 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 372 | იაპონური ზღმარტლი(Mespilus japonica) | 4,4 | ჯანსაღი ხილ-კენკროვანი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 373 | ტუია(Tuia occidentalis) | 12,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 374 | ტუია(Tuia occidentalis) | 9,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 375 | ტუია(Tuia occidentalis) | 9,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 376 | ტუია(Tuia occidentalis) | 11,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 377 | ტუია(Tuia occidentalis) | 10,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 378 | ტუია(Tuia occidentalis) | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 379 | ტუია(Tuia occidentalis) | 9,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 380 | ტუია(Tuia occidentalis) | 13,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 381 | ტუია(Tuia occidentalis) | 12,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 382 | ტუია(Tuia occidentalis) | 9,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 383 | ტუია(Tuia occidentalis) | 10,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

გადარგვა მოხდება უფლებამოსილი ორგანოს ზედამხედველობით დამკვეთის მიერ შერჩეულ ადგილზე აგროტექნიკური პირობების დაცვით. ჯერ მოხდება ნარგავებიდან ძლიერი, კარგად განვითარებული ვარჯის მქონე ღეროს შერჩევა, გასხვლა და ამ ნარგავების ღეროების ფესვის ყელის ღეროს გარშემო წრიულად 20 სმ-ის რადიუსით ნიადაგი მოთხრა იმგვარად, რომ არ დაზიანდეს ნარგავის ფესვთა სისტემა. გადარგვა უნდა მოხდეს გათხრილ ორმოში იმ პირობით, რომ ორმოს სიგანე და სიღრმე უნდა იყოს საკმარისი, რომ გადარგული ნარგავის ფესვები თავისუფლად ჩაეტიოს ორმოში. გადარგვამდე ორმოში უნდა ჩაისხას წყალი, რომ მიწა გაიჟიჟოს წყლით. სასურველია ორმოში ჩასაყრელი მიწა იყოს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ. გადარგვის შემდეგ მწვანე ნარგავი უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვიდან ერთი თვის განმავლობაში რეგულარულად უნდა მოირწყას ნარაგვები, გაუფხვიერდეს მიწა ღეროს გარშემო, გაუკეთდეს ჯამი წყლის (წვიმის წყლისთვისაც) შესაკავებლად. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 10 ლიტრამდე ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფციაური




პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი



ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა: a.aptsiauri13@gmail.com
ტ. 551 156 154

№157 7 ივლისი 2022 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და
ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 4 ივლისს ქალაქი თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; მისამართზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.13.002.566) არსებულ ტერიტორიაზე მესაკუთრე შპს „ლილო მოლი“-ს (ს/კ 208150506) მომართვის საფუძველზე მეტყევე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავის ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს ხე- მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და “პი“-ზე ანუ 3,14-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 283 ძირი ნარგავი, რომელთაგან 161 ძირი წიწვოვანია, დანარჩენები ფოთლოვანი, რომელთაგან 44 ძირი ხილ-კენკროვანია.

დამკვეთს სურს გადარგოს 2 ძირი N26 და N27 კვიპაროზი, რომელთა შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით, ხოლო ხილ-კენკროვნებს გამოიყენებს შეხედულებისამებრ.

ცხრილში მოცემულია ქალაქი თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; მისამართის (საკადასტრო კოდი: 01.19.13.002.566) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა, დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე და შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება:

| № რიგ ზე | მერქნიანი სახეობა | $D_{10}$ დიამეტრი 10 სმ-ზე | სამეურნეო ღონისძიება წითელი - ექვემდებარება მოჭრას, ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას, მწვანე - ადგილზე რჩება | შენიშვნა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ტუია | 15,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 2 | ნეკერჩხალი მინდვრის | 15,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 3 | ცაცხვი | 18,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 4 | ცაცხვი | 16,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 5 | ცაცხვი | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 6 | ნეკერჩხალი მინდვრის | 13,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 7 | ცაცხვი | 17,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 8 | ცაცხვი | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 9 | ცაცხვი | 14,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 10 | ცაცხვი | 20,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 11 | ნეკერჩხალი მინდვრის | 21,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 12 | ნეკერჩხალი მინდვრის | 12,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 13 | ტუია ოქროსფერი | 13,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 14 | ცაცხვი | 14,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ცაცხვი | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 16 | ცაცხვი | 20,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 17 | ცაცხვი | 22,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 18 | ცაცხვი | 17,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 19 | ნეკერჩხალი მინდვრის | 15,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 20 | ნეკერჩხალი მინდვრის | 14,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 21 | თელა | 18,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 22 | ცაცხვი | 23,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 23 | ცაცხვი | 20,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 24 | ცაცხვი | 22,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 25 | კვიპაროზი | 8,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 26 | კვიპაროზი | 41,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით |
| 27 | კვიპაროზი | 32,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით |
| 28 | კვიპაროზი | 33,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით |
| 29 | კვიპაროზი | 18,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 30 | კვიპაროზი | 11,4 | მაღალი ძირკვი | |
| 31 | კვიპაროზი | 18,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | კვიპაროზი | 10,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 33 | კვიპაროზი | 15,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 34 | კვიპაროზი | 16,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 35 | კვიპაროზი | 12,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 36 | კვიპაროზი | 15,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 37 | კვიპაროზი | 12,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 38 | კვიპაროზი | 15,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 39 | კვიპაროზი | 10,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 40 | კვიპაროზი | 19,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 41 | კვიპაროზი | 16,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 42 | კვიპაროზი | 15,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 43 | კვიპაროზი | 12,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 44 | კვიპაროზი | 16,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 45 | კვიპაროზი | 17,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 46 | კვიპაროზი | 14,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 47 | კვიპაროზი | 20,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 48 | კვიპაროზი | 27,7 | ჯანსაღი | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | კვიპაროზი | 19,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 50 | კვიპაროზი | 25,9 | ჯანსაღი | |
| 51 | კვიპაროზი | 16,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 52 | კვიპაროზი | 18,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 53 | კვიპაროზი | 22,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 54 | კვიპაროზი | 22,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 55 | კვიპაროზი | 23,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 56 | კვიპაროზი | 21,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 57 | კვიპაროზი | 21,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 58 | კვიპაროზი | 25,3 | ჯანსაღი | |
| 59 | კვიპაროზი | 15,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 60 | კვიპაროზი | 22,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 61 | კვიპაროზი | 16,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 62 | კვიპაროზი | 16,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 63 | კვიპაროზი | 18,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 64 | კვიპაროზი | 17,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 65 | კვიპაროზი | 24,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 66 | კვიპაროზი | 21,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | კვიპაროზი | 18,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 68 | კვიპაროზი | 20,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 69 | კვიპაროზი | 17,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 70 | კვიპაროზი | 24,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 71 | კვიპაროზი | 17,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 72 | კვიპაროზი | 17,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 73 | კვიპაროზი | 20,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 74 | კვიპაროზი | 19,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 75 | კვიპაროზი | 19,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 76 | კვიპაროზი | 19,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 77 | კვიპაროზი | 18,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 78 | კვიპაროზი | 15,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 79 | კვიპაროზი | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 80 | კვიპაროზი | 15,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 81 | კვიპაროზი | 14,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 82 | კვიპაროზი | 12,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 83 | კვიპაროზი | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 84 | კვიპაროზი | 13,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 85 | კვიპაროზი | 5,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 86 | კვიპაროზი | 12,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 87 | კვიპაროზი | 4,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 88 | კვიპაროზი | 15,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 89 | კვიპაროზი | 11,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 90 | კვიპაროზი | 15,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 91 | კვიპაროზი | 11,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 92 | კვიპაროზი | 5,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 93 | კვიპაროზი | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 94 | კვიპაროზი | 16,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 95 | კვიპაროზი | 11,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 96 | კვიპაროზი | 12,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 97 | კვიპაროზი | 13,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 98 | კვიპაროზი | 11,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 99 | ნეკერჩხალი | 7,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 100 | ჭანჭყატი | 7,6 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 101 | ჭანჭყატი | 11,7 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 102 | ვარდი | 7,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 103 | ნეკერჩხალი | 8,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 104 | ჯონჯოლი | 7,4 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 105 | ვარდი | 8,6 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 106 | ჭანჭყატი | 7,6 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 107 | ნეკერჩხალი | 8,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 108 | ჭანჭყატი | 17,6 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 109 | ჭანჭყატი | 13,9 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 110 | ჭადარი | 7,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 111 | კვიდო | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 112 | ჭანჭყატი | 8,1 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 113 | ჭანჭყატი | 6,2 | ჯანსაღი, 1 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 114 | ვაზი | 3,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | ნებართვას არ საჭიროებს |
| 115 | ჭადარი | 6,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 116 | ჭადარი | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 117 | ჭანჭყატი | 3,6 | ჯანსაღი, 2კაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 118 | ჭანჭყატი | 3,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 119 | ჭადარი | 8,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 120 | ჭანჭყატი | 3,4 – 4,7 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 121 | ფიჭვი იტალიური | 13,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 122 | ფიჭვი იტალიური | 11,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 123 | ფიჭვი იტალიური | 8,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 124 | ფიჭვი იტალიური | 11,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 125 | ფიჭვი იტალიური | 13,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 126 | ფიჭვი იტალიური | 10,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 127 | ფიჭვი იტალიური | 8,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 128 | კვიპაროზი | 29,2 | ჯანსაღი | |
| 129 | კვიპაროზი | 33,3 | ჯანსაღი | |
| 130 | ფიჭვი იტალიური | 3,9 | ზეხმელი | |
| 131 | ფიჭვი იტალიური | 9,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 132 | ფიჭვი იტალიური | 9,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 133 | ფიჭვი იტალიური | 10,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 134 | კვიპაროზი | 22,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 135 | კვიპაროზი | 22,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 136 | კვიპაროზი | 35,2 | ჯანსაღი | |
| 137 | კვიპაროზი | 13,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 138 | კვიპაროზი | 19,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 139 | კვიპაროზი | 11,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 140 | კვიპაროზი | 25,8 | ჯანსაღი | |
| 141 | კვიპაროზი | 14,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 142 | კვიპაროზი | 22,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 143 | კვიპაროზი | 12,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 144 | კვიპაროზი | 19,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 145 | კვიპაროზი | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 146 | კვიპაროზი | 19,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 147 | კვიპაროზი | 20,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 148 | თუთა | 4,2 | ჯანსაღი, | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 149 | თუთა | 33,9 | ჯანსაღი | |
| 150 | ტირიფი | 12,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 151 | ტირიფი | 13,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 152 | ვაზი | 1,5 – 2,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, სამი ძირი | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 153 | თუთა | 18,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 154 | თრიმლი | 7,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 155 | ნეკერჩხალი ამერიკული | 9,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 156 | ნეკერჩხალი ამერიკული | 12,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 157 | ნეკერჩხალი ამერიკული | 11,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 158 | ჭერამი | 8,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 159 | ატამი | 2,2 – 5,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 2 ძირი | |
| 160 | კაკალი | 8,9 | ზეხმელი | |
| 161 | ბროწეული | 6,5 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 162 | ქლიავი | 8,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 163 | ტყემალი | 9,3 | ზეხმელი | |
| 164 | ტყემალი | 18,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 165 | ქლიავი | 14,4 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 166 | ვაზი | 4,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 167 | ლეღვი | 7,9 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 168 | ვაშლი | 7,2 | ზეხმელი, ხილ-კენკროვანი | |
| 169 | ქლიავი | 8,8 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 5 ამონაყარი | |
| 170 | ვაზი | 1,4 | გადანაჭერი, ხილ-კენკროვანი | |
| 171 | ტირიფი | 38,7 | ჯანსაღი | |
| 172 | ვაზი | 8,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 173 | თუთა | 25,9 | ჯანსაღი | |
| 174 | ტირიფი | 27,3 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 175 | თელა | 14,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 176 | თუთა | 25,3 | ჯანსაღი | |
| 177 | ბროწეული | 1,7 – 2,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 2 ბუჩქი | |
| 178 | ტირიფი | 2,1 – 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 179 | ტირიფი | 26,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 180 | ტირიფი | 3,9 – 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 181 | ბუდლეია | 3,4 – 4,5 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 182 | ტირიფი | 24,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 183 | თუთა | 8,9 | ჯანსაღი, ორკაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 184 | ტირიფი | 36,4 | ზეხმელი | |
| 185 | თუთა | 9,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 186 | თუთა | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 187 | ტყემალი | 2,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 188 | ლელვი | 33,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 189 | ვაზი | 1,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 190 | თელა | 2,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 191 | ვაზი | 4,5 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 192 | ვაზი | 5,4 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 193 | ვაზი | 3,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 194 | ნეკერჩხალი | 10,8 | ჯანსაღი, წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 195 | ტირიფი | 41,2 | ჯანსაღი | |
| 196 | ვერხვი | 33,8 | ჯანსაღი | |
| 197 | იფანი | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 198 | ვერხვი | 78,6 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 199 | თუთა | 42,3–116,7 | ჯანსაღი, 4კაპი | |
| 200 | თელა | 6,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ვაზი | 2,7 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 202 | თუთა | 55,7 | ჯანსაღი | |
| 203 | თუთა | 23,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 204 | თუთა | 31,2 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 205 | თუთა | 22,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 206 | თუთა | 19,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 207 | ტირიფი | 38,6 – 61,1 | ჯანსაღი, 2კაპი | |
| 208 | თუთა | 14,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 209 | თელა | 18,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 210 | ლელვი | 13,5 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 211 | ვაზი | 9,1 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 212 | თუთა | 38,9 | 3 ძირი ამონაყარი ძირკვზე | |
| 213 | ლელვი | 3,5 – 8,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, 8 ამონაყარი | |
| 214 | თუთა | 14,4 – 24,2 | ჯანსაღი, 3კაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 215 | ქლიავი | 19,9 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი,4კაპი,6 ამონაყარი | |
| 216 | გლედიჩია | 2,8 – 4,3 | ჯანსაღი, 5 ძირი, 5 ბუჩქი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 217 | აკაკი | 26,1 | ჯანსაღი | |
| 218 | თელა | 58,2 | ჯანსაღი | |
| 219 | გლედიჩია | 9,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 220 | თელა | 12,5 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 221 | თრიმლი | 2,3 – 2,9 | ჯანსაღი, 7 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 222 | თელა | 41,5 | ჯანსაღი | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 223 | ასკილი | 2,5 – 3,8 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 10 ძირი | |
| 224 | ვაზი | 3,9 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 225 | ლელვი | 3,9 – 11,3 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, 7 ძირი | |
| 226 | თელა | 8,7 – 23,8 | ჯანსაღი, 6 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 227 | ბალი | 33,1 | ხილ-კენკროვანი, ხმობადი | |
| 228 | თუთა | 20,9 | ზეხმელი | |
| 229 | თუთა | 29,5 | ჯანსაღი | |
| 230 | ტყემალი | 31,6 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, ორკაპი | |
| 231 | თუთა | 40,4 | ჯანსაღი | |
| 232 | ტყემალი | 38,1 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 233 | ტირიფი | 23,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 234 | ტირიფი | 13,4 – 15,6 | ჯანსაღი, ორკაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 235 | კვიპაროზი | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 236 | კვიპაროზი | 3,8 | ჯანსაღი, ორკაპი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 237 | კვიპაროზი | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 238 | ბიოტა | 3,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 239 | თუთა | 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 240 | ბიოტა | 4,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 241 | ტუია | 5,9 | ჯანსაღი, 7 წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 242 | ბიოტა | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 243 | ტუია | 6,1 | ჯანსაღი, 7 წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 244 | ტუია | 5,9 | ჯანსაღი, 5 წვრილი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 245 | ბიოტა | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 246 | ტუია | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 247 | ბიოტა | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 248 | ბიოტა | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 249 | ტუია | 5,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 250 | ტუია | 11,6 | ჯანსაღი, 6 ძირი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 251 | ტუია | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 252 | ტუია | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 253 | ტუია | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 254 | ტუია | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 255 | ტუია | 9,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 256 | ტუია | 14,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 257 | ტუია | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 258 | ლელვი | 3,1 – 5,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 3 ამონაყარი | |
| 259 | გლედიჩია | 2,5 – 5,6 | ჯანსაღი, 2 ბუჩქი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 260 | გლედიჩია | 3,1 – 7,8 | 8 ამონაყარი, ძირკვი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 261 | ლელვი | 9,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, წვრილი ამონაყარი | |
| 262 | თელა | 5,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 263 | თრიმლი | 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 264 | ნეკერჩხალი | 4,5 | ჯანსაღი, 3 ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 265 | თელა | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 266 | თელა | 4,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 267 | თრიმლი | 3,6 | ზეხმელი | |
| 268 | თელა | 4,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 269 | თრიმლი | 4,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 270 | თელა | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 271 | ზღმარტლი იაპონური | 1,8 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 272 | ზღმარტლი იაპონური | 2,9 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 273 | ქლიავი | 2,2 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 274 | თელა | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 275 | თელა | 4,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 276 | თელა | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 277 | თელა | 3,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 278 | კვიდო | 2,6 – 2,9 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 279 | კვიდო | 4,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 280 | თელა | 5,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 281 | ალუბალი | 4,6 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 282 | კვიდო | 2,8 – 3,2 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 283 | კვიდო | 2,4 – 3,1 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 284 | ალუბალი | 7,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 285 | თელა | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 286 | ალუბალი | 5,4 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 287 | ოლეანდრი | 3,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 288 | თელა | 4,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 289 | ალუბალი | 6,9 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 290 | ალუბალი | 7,2 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 291 | ალუბალი | 6,7 | ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი | |
| 292 | თელა | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 293 | თელა | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 294 | ალუბალი | 6,3 | ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი | |
| 295 | ტუია ოქროსფერი | 6,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 296 | ტუია ოქროსფერი | 7,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 297 | ტუია ოქროსფერი | 7,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 298 | ტუია ოქროსფერი | 6,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 299 | ტუია ოქროსფერი | 6,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 300 | ტუია ოქროსფერი | 6,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 301 | ტუია ოქროსფერი | 7,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 302 | ტუია ოქროსფერი | 7,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 303 | ტუია ჩვეულებრივი | 3,6 – 3,8 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 304 | ტუია ჩვეულებრივი | 2,7 – 3,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 305 | ტუია ჩვეულებრივი | 5,1 | ჯანსაღი, 1 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 306 | ვარდი | 1,6 -1,9 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 307 | ჭანჭყატი | 1,9 – 2,9 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 308 | ჭანჭყატი | 22,3 | ჯანსაღი, 9 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 309 | ტუია | 7,5 | ჯანსაღი 1 ძირი, 2 ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 310 | ნეკერჩხალი ამერიკული | 16,3 | ჯანსაღი, 2 ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 311 | გლედიჩია | 6,5 – 8,5 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 312 | გლედიჩია | 3,8 – 7,3 | ჯანსაღი, 7 ძირი ამონაყარი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 313 | ნეკერჩხალი ამერიკული | 9,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 314 | კვიპაროზი | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 315 | კვიპაროზი | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 316 | კვიპაროზი | 7,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 317 | კვიპაროზი | 6,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 318 | კვიპაროზი | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 319 | კვიპაროზი | 5,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 320 | კვიპაროზი | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 321 | კვიპაროზი | 7,4 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 322 | კვიპაროზი | 4,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 323 | კვიპაროზი | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 324 | კვიპაროზი | 7,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 325 | კვიპაროზი | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 326 | კვიპაროზი | 5,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 327 | კვიპაროზი | 7,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 328 | კვიპაროზი | 6,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 329 | კვიპაროზი | 6,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 330 | კვიპაროზი | 7,6 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 331 | კვიპაროზი | 5,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 332 | კვიპაროზი | 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 333 | კვიპაროზი | 5,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 334 | ჭანჭყატი | 1,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 335 | ჭანჭყატი | 1,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 336 | კვიდო | 1,3 – 1,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 337 | აუკუბა | 1,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 338 | აუკუბა | 2,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 339 | ალუბალი | 2,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 340 | ჭანჭყატი | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 341 | ჭანჭყატი | 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 342 | აუკაუბა | 3,4 – 5,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 343 | კვიდო | 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 344 | იუკა | 3,2 – 6,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 345 | ჭანჭყატი | 3,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 346 | აუკუბა | 3,5 – 6,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 347 | ჰანჭყატი | 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 348 | აუკუბა | 3,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 349 | ჰანჭყატი | 3,2 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 350 | აუკუბა | 3,1 – 5,8 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 351 | ჰანჭყატი | 3,4 – 4,1 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 352 | აუკუბა | 5,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 353 | ჰანჭყატი | 2,2 – 3,2 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 354 | აუკუბა | 4,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 355 | ჰანჭყატი | 1,9 – 3,2 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 356 | აუკუბა | 6,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 357 | ჰანჭყატი | 2,4 – 3,1 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 358 | აუკუბა | 3,1 – 3,9 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 359 | ჰანჭყატი | 2.3 – 2,9 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 360 | აუკუბა | 2,8 – 3,1 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 361 | ჰანჭყატი | 2.2 – 3.4 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 362 | აუკუბა | 2,9 – 3,8 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 363 | ჭანჭყატი | 2.1 – 3.2 | ჯანსაღი, 5 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 364 | აუკუბა | 2,9 – 4,2 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 365 | ჭანჭყატი | 2.3 – 3,5 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 366 | აუკუბა | 2,8 – 3,6 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 367 | ჭანჭყატი | 2,4 – 3,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 368 | აუკუბა | 3,3 – 4,1 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 369 | ჭანჭყატი | 2.2 – 3.7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 370 | აუკუბა | 3,1 – 4,3 | ჯანსაღი, 2 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 371 | კვიდო | 2,1 – 3,5 | ჯანსაღი, 4 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 372 | აუკუბა | 3,2 – 4,4 | ჯანსაღი, 3 ძირი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 373 | ტუია | 12,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 374 | ტუია | 9,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 375 | ტუია | 9,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 376 | ტუია | 11,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 377 | ტუია | 10,5 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 378 | ტუია | 14,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 379 | ტუია | 9,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 380 | ტუია | 13,8 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 381 | ტუია | 12,7 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 382 | ტუია | 9,3 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |
| 383 | ტუია | 10,1 | ჯანსაღი | შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 % |

გადარგვა მოხდება უფლებამოსილი ორგანოს ზედამხედველობით დამკვეთის მიერ შერჩეულ ადგილზე აგროტექნიკური პირობების დაცვით. ჯერ მოხდება ნარგავებიდან ძლიერი, კარგად განვითარებული ვარჯის მქონე ღეროს შერჩევა, გასხვლა და ამ ნარგავების ღეროების ფესვის ყელის ღეროს გარშემო წრიულად 20 სმ-ის რადიუსით ნიადაგი მოთხრა იმგვარად, რომ არ დაზიანდეს ნარგავის ფესვთა სისტემა. გადარგვა უნდა მოხდეს გათხრილ ორმოში იმ პირობით, რომ ორმოს სიგანე და სიღრმე უნდა იყოს საკმარისი, რომ გადარგული ნარგავის ფესვები თავისუფლად ჩაეტიოს ორმოში. გადარგვამდე ორმოში უნდა ჩაისხას წყალი, რომ მიწა გაიჟიჟოს წყლით. სასურველია ორმოში ჩასაყრელი მიწა იყოს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ. გადარგვის შემდეგ მწვანე ნარგავი უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვიდან ერთი თვის განმავლობაში რეგულარულად უნდა მოირწყას ნარაგვები, გაუფხვიერდეს მიწა ღეროს გარშემო, გაუკეთდეს ჯამი წყლის (წვიმის წყლისთვისაც) შესაკავებლად. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 10 ლიტრამდე ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფცაური




პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი